

Памятка пациенту по подготовке к взятию биоматериала для цитологического исследования соскоба шейки матки и цервикального канала

Рекомендуется сдавать анализ не ранее, чем через 7-10 дней после местного применения лечебных препаратов (вагинальных свечей). Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО**:

- За 48 часов перед визитом к врачу для взятия биоматериала воздержаться от половых контактов.
- В день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов с использованием дезинфицирующих средств (мыла, геля).
- Взятие биоматериала производится до или после менструации, но не ранее 7-го дня от начала менструального цикла и не позднее, чем за 5 дней до начала предполагаемой менструации (при этом у пациентки не должно быть даже минимальных кровянистых выделений). Во время менструального кровотечения исследование не проводится.
- Необходимо воздержаться от сдачи анализа в перiovуляторный период (2 дня до и 2 дня после овуляции), при наличии генитальной инфекции.
- При необходимости повторения анализа соскоб для цитологического исследования рекомендуется брать не ранее, чем через три месяца после предыдущего взятия (во избежание потери качества биоматериала).
- В течение 48 часов до взятия биоматериала запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, в том числе вагинальные контрацептивы и лубриканты.
- Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком с использованием геля, кольпоскопию накануне и в день взятия биоматериала.
- В случае наличия участков визуальной патологии на шейке матки биоматериал допустимо брать независимо от указанных выше факторов.
- В период беременности исследование на жидкостную цитологию не проводится!
- **ВАЖНО**: Интервал между взятиями мазков из урогенитального тракта должен составлять не менее 2-3 дней (во избежание потери качества биоматериала).

Действует с 14.08.2023

Памятка пациенту по подготовке к взятию биоматериала для цитологического исследования соскоба шейки матки и цервикального канала

Рекомендуется сдавать анализ не ранее, чем через 7-10 дней после местного применения лечебных препаратов (вагинальных свечей). Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО**:

- За 48 часов перед визитом к врачу для взятия биоматериала воздержаться от половых контактов.
- В день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов с использованием дезинфицирующих средств (мыла, геля).
- Взятие биоматериала производится до или после менструации, но не ранее 7-го дня от начала менструального цикла и не позднее, чем за 5 дней до начала предполагаемой менструации (при этом у пациентки не должно быть даже минимальных кровянистых выделений). Во время менструального кровотечения исследование не проводится.
- Необходимо воздержаться от сдачи анализа в перiovуляторный период (2 дня до и 2 дня после овуляции), при наличии генитальной инфекции.
- При необходимости повторения анализа соскоб для цитологического исследования рекомендуется брать не ранее, чем через три месяца после предыдущего взятия (во избежание потери качества биоматериала).
- В течение 48 часов до взятия биоматериала запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, в том числе вагинальные контрацептивы и лубриканты.
- Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком с использованием геля, кольпоскопию накануне и в день взятия биоматериала.
- В случае наличия участков визуальной патологии на шейке матки биоматериал допустимо брать независимо от указанных выше факторов.
- В период беременности исследование на жидкостную цитологию не проводится!
- **ВАЖНО**: Интервал между взятиями мазков из урогенитального тракта должен составлять не менее 2-3 дней (во избежание потери качества биоматериала).

Действует с 14.08.2023