

ФИО
Пол: Муж
Дата рождения: 28.06.1990
Возраст: 36 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 29.07.2026
Дата поступления образца: 29.07.2026 17:52
Врач: 31.07.2026 15:09
Дата печати результата: 03.08.2026 09:46

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
АТ к NMDA рецептору, IgG	<1:10	титр	<1:10

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» Выдрицкого А.В. в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

М.П. / Подпись врача

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

ФИО
Пол: Муж
Дата рождения: 28.06.1990
Возраст: 36 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 29.07.2026
Дата поступления образца: 29.07.2026 17:52
Врач: 31.07.2026 15:09
Дата печати результата: 03.08.2026 09:46
Исследование

Комментарий к результату исследования

Отсутствие антител к NMDA-рецептору в сыворотке значительно снижает клиническую вероятность наличия аутоиммунного энцефалита. NMDA-рецептор представляет собой гетеромерный комплекс рецептора глутамата, селективно связывающий N-метил-D-аспартат(NMDA). Структура рецептора представлена субъединицей NR1 в комбинации с одной из нескольких субъединиц NR2. При аутоиммунном блокировании NMDA-рецептора антителами могут возникнуть симптомы возбуждения, паранойи, психоза и агрессивного поведения, которые сопровождаются судорогами, нарушениями памяти и речи. Такие симптомы характерны для аутоиммунного энцефалита. У отдельных пациентов с иммуносупрессией на фоне тяжелой соматической патологии или медикаментозной терапии отсутствие антител может наблюдаться при наличии лимбического энцефалита. При наличии характерных симптомов заболевания и отрицательном результате теста, может быть рекомендовано дополнительное исследование цереброспинальной жидкости, а также определение антител к вольтаж-зависимым калиевым каналам(VGKC).

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» Выдрицкого А.В. в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

М.П. / Подпись врача