

Памятка пациенту по подготовке к взятию мазков из урогенитального тракта

Рекомендуется сдавать анализ до начала приема противомикробных препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками перорально, и не ранее, чем через 7-10 дней после местного применения лечебных процедур (вагинальных свечей, антибактериальных препаратов, антисептиков).

Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО:**

- За 1-2 суток перед визитом для сдачи мазков воздержаться от половых контактов.
- Воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-3 часов до взятия мазка из уретры (женщинам – 3 часа, мужчинам - 1,5-2 часа).

У женщин взятие биоматериала производится до или после менструации не ранее, чем на 5-7 день цикла (после полного прекращения кровянистых и мажущих выделений), если другие сроки не назначены врачом. Во время менструального кровотечения исследование не проводится.

В течение 24 часов запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, контрацептивные средства для местного применения. Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.

ВАЖНО: Интервал между взятиями мазков из урогенитального тракта должен составлять не менее 2-3 дней (во избежание потери качества биоматериала).

Действует с 18.03.2025



Памятка пациенту по подготовке к взятию мазков из урогенитального тракта

Рекомендуется сдавать анализ до начала приема противомикробных препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками перорально, и не ранее, чем через 7-10 дней после местного применения лечебных процедур (вагинальных свечей, антибактериальных препаратов, антисептиков).

Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО:**

- За 1-2 суток перед визитом для сдачи мазков воздержаться от половых контактов.
- Воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-3 часов до взятия мазка из уретры (женщинам – 3 часа, мужчинам - 1,5-2 час)

У женщин взятие биоматериала производится до или после менструации не ранее, чем на 5-7 день цикла (после полного прекращения кровянистых и мажущих выделений), если другие сроки не назначены врачом. Во время менструального кровотечения исследование не проводится.

В течение 24 часов запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, контрацептивные средства для местного применения. Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.

ВАЖНО: Интервал между взятиями мазков из урогенитального тракта должен составлять не менее 2-3 дней (во избежание потери качества биоматериала).

Действует с 18.03.2025